

(4) 尿酸

尿酸値の上昇により痛風になる。尿酸値の高い方は、アルコールの飲み過ぎや食事（魚貝類、肉類などの蛋白質、脂質の過剰摂取）に気をつけてください。

有所見者はB2以上とする。

<尿酸検査判定結果>

① 1日ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	24	1,170	3,299	4,028	2,667	817	105	12,110	80.8
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	2	134	410	450	259	67	3	1,325	8.8
C	3	171	457	459	245	45	7	1,387	9.3
D	0	18	57	63	21	2	1	162	1.1
受診者数	29	1,493	4,223	5,000	3,192	931	116	14,984	100
有所見者数	5	323	924	972	525	114	11	2,874	19.2
有所見者率(%)	17.2	21.6	21.9	19.4	16.4	12.2	9.5	19.2	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	49	1,313	3,482	3,845	2,263	650	60	11,662	99.0
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	2	10	25	21	4	0	62	0.5
C	0	1	9	20	12	3	0	45	0.4
D	0	1	3	4	1	1	1	11	0.1
受診者数	49	1,317	3,504	3,894	2,297	658	61	11,780	100
有所見者数	0	4	22	49	34	8	1	118	1.0
有所見者率(%)	0.0	0.3	0.6	1.3	1.5	1.2	1.6	1.0	

② 2日ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	6	207	551	912	897	546	136	3,255	81.8
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	1	31	65	117	90	48	7	359	9.0
C	0	23	85	99	68	27	9	311	7.8
D	0	7	22	14	10	1	0	54	1.4
受診者数	7	268	723	1,142	1,065	622	152	3,979	100
有所見者数	1	61	172	230	168	76	16	724	18.2
有所見者率(%)	14.3	22.8	23.8	20.1	15.8	12.2	10.5	18.2	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1	53	165	382	507	330	55	1,493	98.1
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	1	2	3	4	9	1	20	1.3
C	0	1	0	2	1	3	1	8	0.5
D	0	0	0	0	0	0	1	1	0.1
受診者数	1	55	167	387	512	342	58	1,522	100
有所見者数	0	2	2	5	5	12	3	29	1.9
有所見者率(%)	0.0	3.6	1.2	1.3	1.0	3.5	5.2	1.9	

③全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診

<男性>

	～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1,555	2,614	2,188	1,602	128	0	8,087	78.5
B1	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	216	326	241	161	18	0	962	9.3
C	242	379	295	169	8	0	1,093	10.6
D	42	54	39	21		0	156	1.5
受診者数	2,055	3,373	2,763	1,953	154	0	10,298	100
有所見者数	500	759	575	351	26	0	2,211	21.5
有所見者率(%)	24.3	22.5	20.8	18.0	16.9	0.0	21.5	

<女性>

	～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1,213	2,244	1,839	814	46	0	6,156	98.8
B1	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	5	13	15	8	1	0	42	0.7
C	5	10	8	7	0	0	30	0.5
D	0	0	2	0	0	0	2	0.0
受診者数	1,223	2,267	1,864	829	47	0	6,230	100
有所見者数	10	23	25	15	1	0	74	1.2
有所見者率(%)	0.8	1.0	1.3	1.8	2.1	0.0	1.2	

④ 集団健診

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	3,200	4,425	3,541	3,759	3,430	1,770	345	20,470	80.2
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	329	504	427	461	348	162	22	2,253	8.8
C	319	612	476	449	354	155	20	2,385	9.3
D	50	119	97	80	39	25	5	415	1.6
受診者数	3,898	5,660	4,541	4,749	4,171	2,112	392	25,523	100
有所見者数	698	1,235	1,000	990	741	342	47	5,053	19.8
有所見者率(%)	17.9	21.8	22.0	20.8	17.8	16.2	12.0	19.8	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,721	3,703	3,254	3,441	3,698	2,526	357	19,700	98.9
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	7	10	13	34	31	27	2	124	0.6
C	3	8	6	18	19	24	11	89	0.4
D	1	0	0	4	2	2	4	13	0.1
受診者数	2,732	3,721	3,273	3,497	3,750	2,579	374	19,926	100
有所見者数	11	18	19	56	52	53	17	226	1.1
有所見者率(%)	0.4	0.5	0.6	1.6	1.4	2.1	4.5	1.1	