

8.消化器

(1) 上部消化管X線検査

① 1日人間ドック

<上部消化管X線検査判定結果>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	8	670	1,645	1,608	555	117	2	4,605	75.2
B1	0	39	130	194	66	9	0	438	7.2
B2	2	59	249	424	193	54	0	981	16.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	4	21	40	23	8	0	96	1.6
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	10	772	2,045	2,266	837	188	2	6,120	100.0
有所見者数 (人)	2	102	400	658	282	71	0	1,515	24.8
有所見者率 (%)	20.0	13.2	19.6	29.0	33.7	37.8	0.0	24.8	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	14	440	934	910	321	44	0	2,663	68.7
B1	0	50	177	162	66	5	0	460	11.9
B2	0	59	229	304	110	19	0	721	18.6
C	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0
D	0	0	11	13	7	3	0	34	0.9
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
受診者数 (人)	14	549	1,351	1,390	504	71	0	3,879	100.0
有所見者数 (人)	0	109	417	480	183	27	0	1,216	31.3
有所見者率 (%)	0.0	19.9	30.9	34.5	36.3	38.0	0.0	31.3	

<上部消化管 X 線検査疾患別一覧>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
異常なし	8	670	1,645	1,608	555	117	2	4,605
びらん性胃炎	0	17	44	56	27	3	0	147
胃ポリープ	0	38	159	213	65	10	0	485
胃陥凹性病変	0	0	1	3	1	0	0	5
胃潰瘍	0	0	0		2	0	0	2
胃潰瘍癒痕	0	0	5	12	5	3	0	25
胃粘膜下腫瘍	0	3	8	12	6	1	0	30
胃隆起性病変	0	3	8	11	7	4	0	33
慢性胃炎	2	32	148	273	129	40	0	624
十二指腸潰瘍	0	1	3	1	0	0	0	5
十二指腸潰瘍癒痕	0	10	26	55	22	5	0	118
食道ポリープ	0	0	0	0	0	0	0	0
食道静脈瘤	0	0	0	0	0	0	0	0
食道隆起性病変	0	0	6	7	2	3	0	18
総計	10	772	2,045	2,266	837	188	2	6,120

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
異常なし	14	440	934	910	321	44	0	2,663
びらん性胃炎	0	5	18	22	18	3	0	66
胃ポリープ	0	87	291	285	79	9	0	751
胃陥凹性病変	0	0	1	1	1	1	0	4
胃潰瘍	0	0	0	0	0	0	0	0
胃潰瘍癒痕	0	0	1	3	4	0	0	8
胃粘膜下腫瘍	0	3	8	10	3	0	0	24
胃隆起性病変	0	1	6	4	9	0	0	20
慢性胃炎	0	11	78	128	73	16	0	306
十二指腸潰瘍	0	0	0	0	0	0	0	0
十二指腸潰瘍癒痕	0	2	8	19	8	0	0	37
食道ポリープ	0	0	0	0	0	0	0	0
食道静脈瘤	0	0	0	0	0	0	0	0
食道隆起性病変	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	14	549	1351	1390	504	71	0	3,879

② 2日人間ドック

<上部消化管X線検査判定結果>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	3	8	16	6	0	0	33	67.3
B1	0	0	3	4	3	1	0	11	22.4
B2	0	0	0	3	1	1	0	5	10.2
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	3	11	23	10	2	0	49	100.0
有所見者数 (人)	0	0	3	7	4	2	0	16	32.7
有所見者率 (%)	0.0	0.0	27.3	30.4	40.0	100.0	0.0	32.7	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	0	5	0	5	1	0	11	73.3
B1	0	0	0	2	2	0	0	4	26.7
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	0	5	2	7	1	0	15	100.0
有所見者数 (人)	0	0	0	2	2	0	0	4	26.7
有所見者率 (%)	0.0	0.0	0.0	100.0	28.6	0.0	0.0	26.7	

<上部消化管 X線検査疾患別一覧>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
異常なし	0	3	8	16	6	0	0	33
びらん性胃炎	0	0	1	0	1	0	0	2
胃ポリープ	0	0	3	3	1	1	0	8
胃陥凹性病変	0	0	0	0	0	0	0	0
胃潰瘍	0	0	0	0	0	0	0	0
胃潰瘍癒痕	0	0	0	0	0	1	0	1
胃粘膜下腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0
胃隆起性病変	0	0	0	0	0	0	0	0
慢性胃炎	0	0	0	0	0	0	0	0
十二指腸潰瘍	0	0	0	0	0	0	0	0
十二指腸潰瘍癒痕	0	0	0	0	0	0	0	0
食道ポリープ	0	0	0	0	0	0	0	0
食道静脈瘤	0	0	0	0	0	0	0	0
食道隆起性病変	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	0	3	11	23	10	2	0	49

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
異常なし	0	0	5	0	5	1	0	11
びらん性胃炎	0	0	0	2	0	0	0	2
胃ポリープ	0	0	0	1	2	0	0	3
胃陥凹性病変	0	0	0	0	0	0	0	0
胃潰瘍	0	0	0	0	0	0	0	0
胃潰瘍癒痕	0	0	0	0	0	0	0	0
胃粘膜下腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0
胃隆起性病変	0	0	0	1	0	0	0	1
慢性胃炎	0	0	0	0	0	0	0	0
十二指腸潰瘍	0	0	0	0	0	0	0	0
十二指腸潰瘍癒痕	0	0	0	0	0	0	0	0
食道ポリープ	0	0	0	0	0	0	0	0
食道静脈瘤	0	0	0	0	0	0	0	0
食道隆起性病変	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	0	0	5	2	7	1	0	15

③ 全国健保管掌健康保険生活習慣病予防健診

< 上部消化管 X 線検査判定結果 >

< 男性 >

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1,265	1,838	1,232	701	44	0	5,080	71.2
B1	0	97	218	218	144	7	0	684	9.6
B2	0	142	325	304	292	18	0	1,081	15.1
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	34	68	97	88	5	0	292	4.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	1,538	2,449	1,851	1,225	74	0	7,137	100.0
有所見者数 (人)	0	273	611	619	524	30	0	2,057	28.8
有所見者率 (%)	0.0	17.8	24.9	33.4	42.8	40.5	0.0	28.8	

< 女性 >

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	551	867	604	248	6	0	2,276	66.9
B1	0	89	215	184	55	1	0	544	16.0
B2	0	73	205	162	62	1	0	503	14.8
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	11	15	35	18	1	0	80	2.4
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	724	1,302	985	383	9	0	3,403	100.0
有所見者数 (人)	0	173	435	381	135	3	0	1,127	33.1
有所見者率 (%)	0.0	23.9	33.4	38.7	35.2	33.3	0.0	33.1	

<上部消化管 X 線検査疾患別一覧>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
異常なし	0	1,265	1,838	1,232	701	44	0	5,080
ニッシェ様	0	0	3	7	5	1	0	16
バリウム斑	0	0	8	8	11	1	0	28
胃角鈍化	0	0	2	5	3	0	0	10
胃隆起性病変	0	78	183	153	105	6	0	525
胃陥凹性病変	0	5	3	6	10	0	0	24
対向弯入	0	0	0	1	1	0	0	2
粘膜集中	0	16	27	25	23	1	0	92
粘膜粗大	0	2	0	7	2	0	0	11
変形（胃）	0	1	2	0	1	1	0	5
辺縁不整	0	0	5	3	2	1	0	11
十二指腸変形	0	13	33	23	33	2	0	104
食道裂孔ヘルニア	0	1	3	3	8	0	0	15
総計	0	1,538	2,449	1,851	1225	74	0	7,137

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
異常なし	0	551	867	604	248	6	0	2,276
ニッシェ様	0	1	1	0	0	0	0	2
バリウム斑	0	0	1	5	2	0	0	8
胃角鈍化	0	0	0	1	0	0	0	1
胃隆起性病変	0	110	276	197	61	0	0	644
胃陥凹性病変	0	1	0	0	0	0	0	1
対向弯入	0	0	0	0	0	0	0	0
粘膜集中	0	2	2	6	5	0	0	15
粘膜粗大	0	0	0	1	0	0	0	1
変形（胃）	0	0	0	1	0	0	0	1
辺縁不整	0	0	0	0	1	0	0	1
十二指腸変形	0	1	6	12	4	0	0	23
食道裂孔ヘルニア	0	0	0	2	0	0	0	2
総計	0	724	1,302	985	383	9	0	3,403

④ 集団検診

1) 直接撮影

<上部消化管 X 線検査判定結果>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	20	206	370	224	66	12	0	898	73.1
B1	2	16	47	38	10	2	0	115	9.4
B2	3	18	62	49	43	6	0	181	14.7
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	1	5	13	7	8	0	0	34	2.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	26	245	492	318	127	20	0	1,228	100.0
有所見者数 (人)	6	39	122	94	61	8	0	330	26.9
有所見者率 (%)	23.1	15.9	24.8	29.6	48.0	40.0	0.0	26.9	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	25	146	280	193	36	3	0	683	62.1
B1	1	25	75	40	12	0	0	153	13.9
B2	1	24	85	93	20	1	0	224	20.4
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	6	10	17	7	0	0	40	3.6
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	27	201	450	343	75	4	0	1,100	100.0
有所見者数 (人)	2	55	170	150	39	1	0	417	37.9
有所見者率 (%)	7.4	27.4	37.8	43.7	52.0	25.0	0.0	37.9	

<上部消化管 X 線検査疾患別一覧>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
異常なし	20	206	370	224	66	12	0	898
ニッシェ様	0	0	0	0	0	0	0	0
バリウム斑	0	0	2	0	0	0	0	2
胃角鈍化	0	0	0	0	0	0	0	0
胃隆起性病変	1	15	40	24	10	1	0	91
胃陥凹性病変	0	2	2	0	2	0	0	6
対向弯入	0	0	0	0	0	0	0	0
粘膜集中	1	0	5	2	4	0	0	12
粘膜粗大	0	0	0	2	0	0	0	2
変形（胃）	0	0	0	1	0	0	0	1
辺縁不整	0	0	1	2	1	0	0	4
十二指腸変形	0	1	4	7	4	0	0	16
食道裂孔ヘルニア	0	0	1	4	2	2	0	9
総計	26	245	492	318	127	20	0	1,228

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
異常なし	25	146	280	193	36	3	0	683
ニッシェ様	0	0	0	0	0	0	0	0
バリウム斑	0	0	0	0	1	0	0	1
胃角鈍化	0	0	0	0	0	0	0	0
胃隆起性病変	1	38	111	66	13	0	0	229
胃陥凹性病変	0	0	0	1	1	0	0	2
対向弯入	0	0	0	0	0	0	0	0
粘膜集中	0	0	2	4	0	0	0	6
粘膜粗大	0	0	0	0	0	0	0	0
変形（胃）	0	0	0	0	0	0	0	0
辺縁不整	0	0	0	0	0	0	0	0
十二指腸変形	0	0	2	5	2	0	0	9
食道裂孔ヘルニア	0	0	1	0	0	0	0	1
総計	27	201	450	343	75	4	0	1,100

2) 間接撮影

< 胃部 X 線検査判定結果 >

< 男性 >

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	15	652	1,195	1,274	1,363	717	5	5,221	73.2
B1	2	116	276	336	544	317	2	1,593	22.3
B2	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
D	0	13	44	67	115	80	0	319	4.5
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	17	781	1,515	1,677	2,023	1,114	7	7,134	100.0
有所見者数 (人)	2	129	320	403	660	397	2	1,913	26.8
有所見者率 (%)	11.8	16.5	21.1	24.0	32.6	35.6	28.6	26.8	

< 女性 >

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	3	311	496	532	938	500	2	2,782	67.7
B1	0	62	192	273	426	236	1	1,190	29.0
B2	0	0	0	1	1	0	0	2	0.05
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	8	12	30	46	38	0	134	3.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	3	381	700	836	1411	774	3	4,108	100.0
有所見者数 (人)	0	70	204	304	473	274	1	1,326	32.3
有所見者率 (%)	0.0	18.4	29.1	36.4	33.5	35.4	33.3	32.3	

< 胃部 X 線検査疾患別一覧 >

< 男性 >

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
異常なし	15	652	1,195	1,274	1,363	717	5	5,221
ニッシェ様	0	0	3	3	8	3	0	17
バリウム斑	0	3	11	10	22	8	0	54
胃角鈍化	0	2	2	4	6	5	0	19
胃隆起性病変	1	40	133	122	132	68	0	496
胃陥凹性病変	0	0	1	2	4	1	0	8
対向弯入	0	0	0	1	3	0	0	4
粘膜集中	0	4	6	13	35	13	0	71
粘膜粗大	0	0	5	9	18	9	0	41
変形（胃）	0	0	1	5	4	3	0	13
辺縁不整	0	0	2	2	6	5	0	15
十二指腸変形	0	5	14	22	33	16	1	91
食道裂孔ヘルニア	1	0	1	0	6	13	0	21
総計	17	781	1,515	1,677	2,023	1,114	7	7,134

< 女性 >

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
異常なし	3	311	496	532	938	500	2	2,782
ニッシェ様	0	1	0	0	0	0	0	1
バリウム斑	0	2	5	9	3	5	0	24
胃角鈍化	0	0	0	1	2	0	0	3
胃隆起性病変	0	51	140	151	181	96	1	620
胃陥凹性病変	0	0	0	1	2	3	0	6
対向弯入	0	0	0	1	0	0	0	1
粘膜集中	0	0	0	3	5	3	0	11
粘膜粗大	0	0	0	1	3	3	0	7
変形（胃）	0	0	0	1	3	0	0	4
辺縁不整	0	0	1	0	2	3	0	6
十二指腸変形	0	1	4	13	23	13	0	54
食道裂孔ヘルニア	0	0	0	1	4	5	0	10
総計	3	381	700	836	1411	774	3	4,108