

(4)全大腸内視鏡検査

2日ドック消化器コース、1日ドック消化器コースの希望者、便潜血検査結果陽性者・保険診療外来受診者を対象に全大腸内視鏡検査を行った。

<検査結果判定> ※有所見率…B2以上

①1日ドック消化器コース（希望者）

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	1	2	1	2	0	6	27.3
B1	0	2	3	3	0	8	36.4
B2	0	1	2	4	1	8	36.4
受診者数(人)	1	5	6	9	1	22	100.0
有所見者率(%)	0.0	20.0	33.3	44.4	100.0	36.4	

<女性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	1	3	1	2	0	7	63.6
B1	0	0	0	1	1	2	18.2
B2	0	0	0	1	0	1	9.1
D	0	0	1	0	0	1	9.1
受診者数(人)	1	3	2	4	1	11	100.0
有所見者率(%)	0.0	0.0	50.0	25.0	0.0	18.2	

② 2日ドック消化器コース

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	1	5	5	4	5	3	23	22.3
B1	0	0	10	8	5	3	26	25.2
B2	0	3	2	8	12	5	30	29.1
D	0	0	3	8	12	1	24	23.3
受診者数(人)	1	8	20	28	34	12	103	100.0
有所見者率(%)	0.0	37.5	25.0	57.1	70.6	50.0	52.4	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	0	2	8	3	5	1	19	50.0
B1	0	2	0	3	2	1	8	21.1
B2	0	0	1	4	3	0	8	21.1
D	1	0	0	1	0	1	3	7.9
受診者数(人)	1	4	9	11	10	3	38	100.0
有所見者率(%)	100.0	0.0	11.1	45.5	30.0	33.3	28.9	

③保険診療外来

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	合計(人)	比率(%)
A	4	4	1	1	4	14	25.5
B1	0	1	2	3	2	8	14.5
B2	0	3	1	4	3	11	20.0
D	0	2	8	8	4	22	40.0
受診者数(人)	4	10	12	16	13	55	100.0
有所見者率(%)	0.0	50.0	75.0	75.0	53.8	60.0	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	1	8	2	2	0	0	13	46.4
B1	0	3	2	0	1	0	6	21.4
B2	0	0	0	0	1	1	2	7.1
D	0	2	2	1	2	0	7	25.0
受診者数(人)	1	13	6	3	4	1	28	100.0
有所見者率(%)	0.0	15.4	33.3	33.3	75.0	100.0	32.1	

<検査所見>

① 1日 ドック消化器コース（希望者）

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計（人）
異常なし	1	2	1	2	0	6
痔核	0	0	1	1	0	2
大腸憩室	0	1	3	5	1	10
大腸ポリープ	0	2	2	5	2	11
粘膜下腫瘍	0	0	1	0	0	1
その他の病変	0	2	2	2	0	6
総計	1	7	10	15	3	36

<女性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)
異常なし	1	3	1	2	0	7
痔核	0	0	0	2	0	2
大腸憩室	0	0	1	0	1	2
大腸ポリープ	0	0	1	1	0	2
表面隆起型病変	0	0	1	0	0	1
総計	1	3	4	5	1	14

② 2日 ドック消化器コース

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)
異常なし	1	5	5	4	5	3	23
痔核	0	0	1	0	2	2	5
大腸憩室	0	0	12	15	14	5	46
大腸炎	0	0	1	0	2	0	3
大腸ポリープ	0	7	5	32	51	15	110
表面隆起型病変	0	0	0	0	1	0	1
粘膜下腫瘍	0	0	0	1	0	0	1
その他の病変	0	0	2	4	4	3	13
総計	1	12	26	56	79	28	202

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)
異常なし	0	2	8	3	5	1	19
大腸憩室	0	0	0	4	4	1	9
大腸炎	1	0	0	0	0	0	1
大腸ポリープ	0	0	1	7	3	2	13
粘膜下腫瘍	0	1	0	0	1	0	2
その他の病変	0	1	0	1	1	0	3
総計	1	4	9	15	14	4	47

③保険診療外来

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	合計(人)
異常なし	4	4	1	1	4	14
痔核	0	0	2	0	3	5
大腸憩室	0	4	3	5	5	17
大腸ポリープ	0	11	17	30	18	76
表面平坦型病変	0	0	0	1	0	1
表面隆起型病変	0	0	0	0	3	3
その他の病変	0	2	4	3	4	13
総計	4	21	27	40	37	129

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)
異常なし	1	8	2	2	0	0	13
痔核	0	1	2	0	1	0	4
大腸憩室	0	3	0	0	0	0	3
潰瘍性病変	0	0	0	0	2	0	2
大腸ポリープ	0	0	3	1	7	1	12
表面隆起型病変	0	1	0	0	0	0	1
その他の病変	0	1	0	0	0	0	1
総計	1	14	7	3	10	1	36

<大腸組織検査結果>

<男性>

	40~49	50~59	合計(人)	比率(%)
Group I	1	1	2	50.0
Group III	1	1	2	50.0
受診者数(人)	2	2	4	100.0

<女性>

	30~39	60~69	合計(人)	比率(%)
Group I	1	0	1	33.3
Group III	1	0	1	33.3
Group V	0	1	1	33.3
受診者数(人)	2	1	3	100.0

Group I : 正常組織および異型を示さない良性病変

Group II : 異型を示すが良性と判定される病変

Group III : 良性と悪性の境界領域の病変

Group IV : 癌が強く疑われる病変

Group V : 癌