

(4)全大腸内視鏡検査

2日ドック消化器コース、1日ドック消化器コースの希望者、便潜血検査結果陽性者・保険診療外来受診者を対象に全大腸内視鏡検査を行った。

<検査結果判定> ※有所見率…B2以上

①1日ドック消化器コース（希望者）

<男性>

	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	合計(人)	比率(%)
A	1	2	1	4	0	8	32.0
B1	0	2	3	1	1	7	28.0
B2	0	1	3	4	0	8	32.0
D	0	0	1	1	0	2	8.0
受診者数(人)	1	5	8	10	1	25	100.0
有所見者率(%)	0.0	20.0	50.0	50.0	0.0	40.0	

<女性>

	40~49	60~69	70~79	合計(人)	比率(%)
A	0	1	0	1	25.0
B1	1	0	0	1	25.0
B2	0	0	1	1	25.0
D	0	0	1	1	25.0
受診者数(人)	1	1	2	4	100.0
有所見者率(%)	0.0	0.0	100.0	50.0	

②2日ドック消化器コース

<男性>

	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	合計(人)	比率(%)
A	3	10	7	6	1	27	25.2
B1	0	1	12	12	0	25	23.4
B2	0	3	13	16	2	34	31.8
D	3	4	6	7	1	21	19.6
受診者数(人)	6	18	38	41	4	107	100.0
有所見者率(%)	50.0	38.9	50.0	56.1	75.0	51.4	

<女性>

	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	合計(人)	比率(%)
A	1	3	3	5	1	13	46.4
B1	0	2	2	2	0	6	21.4
B2	1	0	2	1	2	6	21.4
D	0	0	1	2	0	3	10.7
受診者数(人)	2	5	8	10	3	28	100.0
有所見者率(%)	50.0	0.0	37.5	30.0	66.7	32.1	

③保険診療外来

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	合計(人)	比率(%)
A	0	3	3	2	1	9	25.0
B1	0	0	0	0	4	4	11.1
B2	0	0	3	1	6	10	27.8
D	1	1	4	5	2	13	36.1
受診者数(人)	1	4	10	8	13	36	100.0
有所見者率(%)	100.0	25.0	70.0	75.0	61.5	63.9	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	1	2	1	2	0	1	7	41.2
B1	1	0	0	3	0	0	4	23.5
B2	0	0	0	3	0	0	3	17.6
D	1	0	0	1	1	0	3	17.6
受診者数(人)	3	2	1	9	1	1	17	100.0
有所見者率(%)	33.3	0.0	0.0	44.4	100.0	0.0	35.3	

<検査所見>

① 1日 ドック消化器コース（希望者）

<男性>

	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	合計（人）
異常なし	1	2	1	4	0	8
痔核	0	1	1	0	0	2
大腸憩室	0	2	3	5	2	12
大腸ポリープ	0	2	5	11	0	18
その他の病変	0	0	3	5	0	8
総計	1	7	13	25	2	48

<女性>

	40~49	60~69	70~79	合計(人)
異常なし	0	1	0	1
痔核	1	0	0	1
大腸ポリープ	0	0	2	2
その他の病変	0	0	1	1
総計	1	1	3	5

② 2日 ドック消化器コース

<男性>

	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	合計(人)
異常なし	3	10	7	6	1	27
痔核	0	2	0	3	0	5
大腸憩室	0	3	20	25	5	53
潰瘍性病変	0	0	1	0	0	1
大腸ポリープ	4	9	31	40	3	87
その他の病変	2	3	4	3	1	13
総計	9	27	63	77	10	186

<女性>

	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	合計(人)
異常なし	1	3	3	5	1	13
痔核	0	1	0	0	0	1
大腸憩室	0	1	2	3	1	7
大腸ポリープ	1	0	3	4	1	9
粘膜下腫瘍	0	0	1	0	0	1
その他の病変	0	2	1	1	2	6
総計	2	7	10	13	5	37

③保険診療外来

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	合計(人)
異常なし	0	3	3	2	1	9
痔核	1	0	1	2	2	6
大腸憩室	0	0	3	0	7	10
大腸炎	0	0	2	0	2	4
大腸ポリープ	0	1	12	6	16	35
表面隆起型病変	0	0	0	1	0	1
その他の病変	1	0	2	2	2	7
総計	2	4	23	13	30	72

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)
異常なし	1	2	1	2	0	1	7
痔核	0	0	0	1	0	0	1
大腸憩室	0	0	0	2	2	0	4
大腸炎	2	0	0	0	0	0	2
大腸ポリープ	0	0	0	6	1	0	7
その他の病変	0	0	0	1	0	0	1
総計	3	2	1	12	3	1	22

<大腸組織検査結果>

<男性>

	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	合計(人)	比率(%)
Group I	1	0	3	3	0	7	31.8
Group II	0	1	0	1	0	2	9.1
Group III	0	1	3	3	5	12	54.5
Group IV	0	0	1	0	0	1	4.5
受診者数(人)	1	2	7	7	5	22	100.0

<女性>

	~29	50~59	60~69	合計(人)	比率(%)
Group I	1	0	0	1	20.0
Group III	0	2	2	4	80.0
受診者数(人)	1	2	2	5	100.0

Group I : 正常組織および異型を示さない良性病変

Group II : 異型を示すが良性と判定される病変

Group III : 良性と悪性の境界領域の病変

Group IV : 癌が強く疑われる病変

Group V : 癌