

(7)ヘリコバクター・ピロリ検査

ヘリコバクター・ピロリ菌は胃・十二指腸潰瘍、また胃癌において関連が深いといわれている。わが国では感染者が多く、中高年以降では、健常者でも60～70%で本抗体は陽性になるといわれている。

<血液中ヘリコバクター・ピロリ抗体検査判定結果>

① 1日ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
陰性(−)	11	182	519	793	694	211	12	2,422
陽性(+)	0	28	94	145	141	53	9	470
受診者数	11	210	613	938	835	264	21	2,892
陽性率 (%)	0.0	13.3	15.3	15.5	16.9	20.1	42.9	16.3

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
陰性(−)	6	139	381	460	342	103	7	1,438
陽性(+)	3	18	64	108	101	24	3	321
受診者数	9	157	445	568	443	127	10	1,759
陽性率 (%)	33.3	11.5	14.4	19.0	22.8	18.9	30.0	18.2

② 2日ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
陰性(−)	9	225	585	989	811	315	45	2,979
陽性(+)	0	26	84	147	119	55	18	449
受診者数	9	251	669	1,136	930	370	63	3,428
陽性率 (%)	0.0	10.4	12.6	12.9	12.8	14.9	28.6	13.1

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
陰性(−)	3	71	177	337	374	163	13	1,138
陽性(+)	0	7	12	46	66	26	7	164
受診者数	3	78	189	383	440	189	20	1,302
陽性率 (%)	0.0	9.0	6.3	12.0	15.0	13.8	35.0	12.6