

(4) 尿酸

尿酸値の上昇により痛風になることがある。尿酸値の高い方は、アルコールの飲み過ぎや食事

(魚貝類、肉類などの蛋白質、脂質の過剰摂取) など生活習慣に注意が必要である。

有所見者はB 2以上とする。

<尿酸検査判定結果>

① 1日ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	29	1,069	3,146	3,636	2,752	832	124	11,588	80.2
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	6	143	423	413	254	65	2	1,306	9.0
C	7	157	462	472	222	57	10	1,387	9.6
D	0	22	66	56	27	4	1	176	1.2
受診者数	42	1,391	4,097	4,577	3,255	958	137	14,457	100.0
有所見者数	13	322	951	941	503	126	13	2,869	19.8
有所見者率 (%)	31.0	23.1	23.2	20.6	15.5	13.2	9.5	19.8	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	38	1,174	3,434	3,775	2,383	661	71	11,536	98.8
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	1	15	28	30	6	2	82	0.7

C	0	1	14	22	16	3	0	56	0.5
D	0	0	2	3	0	0	0	5	0.0
受診者数	38	1,176	3,465	3,828	2,429	670	73	11,679	100.0
有所見者数	0	2	31	53	46	9	2	143	1.2
有所見者率 (%)	0.0	0.2	0.9	1.4	1.9	1.3	2.7	1.2	

②2日ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	8	146	516	700	849	480	108	2,807	80.9
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	15	73	96	89	29	8	310	8.9
C	3	31	86	100	69	26	9	324	9.3
D	1	5	10	7	5	2	0	30	0.9
受診者数	12	197	685	903	1,012	537	125	3,471	100.0
有所見者数	4	51	169	203	163	57	17	664	19.1
有所見者率(%)	33.3	25.9	24.7	22.5	16.1	10.6	13.6	19.1	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	4	55	213	335	438	274	48	1,367	98.5
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	2	2	7	2	0	13	0.9
C	0	0	1	4	1	2	0	8	0.6
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	4	55	216	341	446	278	48	1,388	100.0
有所見者数	0	0	3	6	8	4	0	21	1.5
有所見者率(%)	0.0	0.0	1.4	1.8	1.8	1.4	0.0	1.5	

③全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診

<男性>

	～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1,417	2,631	2,139	1,690	145	0	8,022	77.8
B1	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	201	361	246	172	18	0	998	9.7
C	222	438	285	150	6	0	1,101	10.7
D	49	74	42	20	1	0	186	1.8
受診者数	1,889	3,504	2,712	2,032	170	0	10,307	100.0
有所見者数	472	873	573	342	25	0	2,285	22.2
有所見者率(%)	25.0	24.9	21.1	16.8	14.7	0.0	22.2	

<女性>

	～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1,097	2,465	1,839	872	47	0	6,320	98.6
B1	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	7	14	16	10	1	0	48	0.7
C	4	8	15	8	1	0	36	0.6
D	1	3	3	0	0	0	7	0.1
受診者数	1,109	2,490	1,873	890	49	0	6,411	100.0
有所見者数	12	25	34	18	2	0	91	1.4
有所見者率(%)	1.1	1.0	1.8	2.0	4.1	0.0	1.4	

④ 集団健診

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	3,176	4,393	3,420	3,482	3,599	1,794	360	20,224	79.1
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	374	554	458	370	393	126	32	2,307	9.0
C	387	610	524	468	417	158	26	2,590	10.1
D	66	129	97	76	47	21	4	440	1.7
受診者数	4,003	5,686	4,499	4,396	4,456	2,099	422	25,561	100.0
有所見者数	827	1,293	1,079	914	857	305	62	5,337	20.9
有所見者率 (%)	20.7	22.7	24.0	20.8	19.2	14.5	14.7	20.9	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,698	3,857	3,534	3,284	3,872	2,446	426	20,117	98.8
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	10	16	10	35	30	29	7	137	0.7
C	4	8	12	24	21	24	12	105	0.5
D	0	0	3	2	1	1	0	7	0.0
受診者数	2,712	3,881	3,559	3,345	3,924	2,500	445	20,366	100.0
有所見者数	14	24	25	61	52	54	19	249	1.2
有所見者率 (%)	0.5	0.6	0.7	1.8	1.3	2.2	4.3	1.2	