

(6) ペプシノゲン

萎縮性胃炎の強い人に胃がんが発生しやすいことが知られている。

この萎縮性胃炎の程度を調べる検査である。

有所見者はD以上とする。

＜ペプシノゲン検査判定結果＞

① 1日ドック

＜男性＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	7	135	536	762	789	256	18	2,503	95.1
D	0	3	10	37	45	26	9	130	4.9
受診者数	7	138	546	799	834	282	27	2,633	100.0
有所見者数	0	3	10	37	45	26	9	130	4.9
有所見者率(%)	0.0	2.2	1.8	4.6	5.4	9.2	33.3	4.9	

＜女性＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	5	61	226	345	302	100	4	1,043	93.3
D	0	1	8	22	27	10	7	75	6.7
受診者数	5	62	234	367	329	110	11	1,118	100.0
有所見者数	0	1	8	22	27	10	7	75	6.7
有所見者率(%)	0.0	1.6	3.4	6.0	8.2	9.1	63.6	6.7	

② 集団健診

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	5	9	6	5	1	0	26	96.3
D	0	0	0	0	1	0	0	1	3.7
受診者数	0	5	9	6	6	1	0	27	100.0
有所見者数	0	0	0	0	1	0	0	1	3.7
有所見者率 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	3.7	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	5	13	3	2	1	0	24	88.9
D	0	0	1	1	1	0	0	3	11.1
受診者数	0	5	14	4	3	1	0	27	100.0
有所見者数	0	0	1	1	1	0	0	3	11.1
有所見者率 (%)	0.0	0.0	7.1	25.0	33.3	0.0	0.0	11.1	