

## (7) ヘリコバクター・ピロリ検査

ヘリコバクター・ピロリ菌は胃・十二指腸潰瘍、また胃癌においても関連が深いといわれている。

わが国では感染者が多く、中高年以降では、健常者でも60～70%で

本抗体は陽性になるといわれている。

<血液中ヘリコバクター・ピロリ抗体検査判定結果>

## ① 1日ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
陰性(-)	9	178	585	810	807	262	18	2,669
陽性(+)	0	23	88	126	129	40	9	415
受診者数	9	201	673	936	936	302	27	3,084
陽性率 (%)	0.0	11.4	13.1	13.5	13.8	13.2	33.3	13.5

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
陰性(-)	6	121	375	456	387	114	6	1,465
陽性(+)	1	10	46	96	70	24	6	253
受診者数	7	131	421	552	457	138	12	1,718
陽性率 (%)	14.3	7.6	10.9	17.4	15.3	17.4	50.0	14.7

## ②2日ドック

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
陰性(-)	9	181	628	815	837	314	48	2,832
陽性(+)	3	16	57	88	85	35	11	295
受診者数	12	197	685	903	922	349	59	3,127
陽性率 (%)	25.0	8.1	8.3	9.7	9.2	10.0	18.6	9.4

## &lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
陰性(-)	4	51	196	318	346	154	18	1,087
陽性(+)	0	4	20	23	38	16	3	104
受診者数	4	55	216	341	384	170	21	1,191
陽性率 (%)	0.0	7.3	9.3	6.7	9.9	9.4	14.3	8.7