

4. 前立腺超音波検査

① 1日人間ドック

<検査結果判定>

| | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|--------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| A | 7 | 140 | 588 | 908 | 924 | 249 | 47 | 2,863 | 90.3 |
| B1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.1 |
| B2 | 0 | 0 | 8 | 47 | 143 | 90 | 14 | 302 | 9.5 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 受診者数 (人) | 7 | 141 | 596 | 955 | 1,067 | 342 | 61 | 3,169 | 100.0 |
| 有所見者数 (人) | 0 | 1 | 8 | 47 | 143 | 93 | 14 | 306 | 9.7 |
| 有所見者率 (%) | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 4.9 | 13.4 | 27.2 | 23.0 | 9.7 | |

* 消化器コース・がんセット・スーパーがんどックを対象とする。

<主な超音波所見>

| | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|
| 前立腺腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 前立腺嚢胞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 前立腺肥大 | 0 | 0 | 8 | 46 | 143 | 89 | 13 | 299 |
| 受診者数 (人) | 7 | 141 | 596 | 955 | 1,067 | 342 | 61 | 3,169 |

② 2日人間ドック

＜検査結果判定＞

| | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|--------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| A | 1 | 26 | 106 | 187 | 265 | 151 | 44 | 780 | 82.6 |
| B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |
| B2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 56 | 55 | 29 | 162 | 17.2 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 受診者数 (人) | 1 | 26 | 108 | 207 | 323 | 206 | 73 | 944 | 100.0 |
| 有所見者数 (人) | 0 | 0 | 2 | 20 | 58 | 55 | 29 | 164 | 17.4 |
| 有所見者率 (%) | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.7 | 18.0 | 26.7 | 39.7 | 17.4 | |

*がんセット・オプションを対象とする。

＜主な超音波所見＞

| | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|
| 前立腺腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前立腺嚢胞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 前立腺肥大 | 0 | 0 | 2 | 20 | 56 | 55 | 29 | 162 |
| 総計 | 1 | 26 | 108 | 207 | 323 | 206 | 73 | 944 |