

(6) ペプシノゲン

萎縮性胃炎の強い人に胃がんが発生しやすいことが知られている。

この萎縮性胃炎の程度を調べる検査である。

有所見者はD以上とする。

<ペプシノゲン検査判定結果>

① 1日ドック

<男性>

| | ~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~ | 合計 (人) | 比率(%) |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-------|
| A | 7 | 134 | 473 | 726 | 695 | 23 | 11 | 2,249 | 94.1 |
| D | 0 | 5 | 12 | 37 | 44 | 34 | 9 | 141 | 5.9 |
| 受診者数 | 7 | 139 | 485 | 763 | 739 | 57 | 20 | 2,390 | 100.0 |
| 有所見者数 | 0 | 5 | 12 | 37 | 44 | 34 | 9 | 141 | 5.9 |
| 有所見者率(%) | 0.0 | 3.6 | 2.5 | 4.8 | 6.0 | 59.6 | 45.0 | 5.9 | |

<女性>

| | ~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~ | 合計 (人) | 比率(%) |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-------|
| A | 2 | 6 | 221 | 3 | 268 | 89 | 6 | 946 | 91.6 |
| D | 1 | 0 | 11 | 26 | 35 | 1 | 4 | 87 | 8.4 |
| 受診者数 | 3 | 6 | 232 | 29 | 303 | 90 | 10 | 1,033 | 100.0 |
| 有所見者数 | 1 | 0 | 11 | 26 | 35 | 1 | 4 | 87 | 8.4 |
| 有所見者率(%) | 33.3 | 0.0 | 4.7 | 89.7 | 11.6 | 1.1 | 40.0 | 8.4 | |

② 集団健診

<男性>

| | ~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~ | 合計 (人) | 比率(%) |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|-------|
| A | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 21 | 91.3 |
| D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.7 |
| 受診者数 | 0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 23 | 100.0 |
| 有所見者数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.01 |
| 有所見者率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | |

<女性>

| | ~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~ | 合計 (人) | 比率(%) |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|-------|
| A | 0 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 24 | 85.7 |
| D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14.3 |
| 受診者数 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 28 | 100.0 |
| 有所見者数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.01 |
| 有所見者率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 25.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | |