

(4)全大腸内視鏡検査

<検査結果判定> ※有所見率…B2以上

① 2日ドック

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	5	17	10	10	4	46	29.3
B1	1	8	13	15	6	43	27.4
B2	3	6	12	19	9	49	31.2
D	0	3	9	6	1	19	12.1
受診者数(人)	9	34	44	50	20	157	100.0
有所見者率(%)	33.3	26.5	47.7	50.0	50.0	43.3	

<女性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	3	5	14	11	4	37	64.9
B1	0	2	4	2	2	10	17.5
B2	0	0	2	1	0	3	5.3
D	1	0	1	3	2	7	12.3
受診者数(人)	4	7	21	17	8	57	100.0
有所見者率(%)	25.0	0.0	14.3	23.5	25.0	17.5	

② 保険診療外来

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	70～79	合計(人)	比率(%)
A	1	1	0	1	0	3	37.5
B1	0	0	0	0	1	1	12.5
B2	0	0	2	0	0	2	25.0
D	0	1	0	1	0	2	25.0
受診者数(人)	1	2	2	2	1	8	100.0
有所見者率(%)	0.0	50.0	100.0	50.0	0.0	50.0	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	合計(人)	比率(%)
A	0	1	0	1	0	2	28.6
B1	1	0	1	1	0	3	42.9
D	1	0	0	0	1	2	28.6
受診者数(人)	2	1	1	2	1	7	100.0
有所見者率(%)	50.0	0.0	0.0	0.0	100.0	28.6	

<検査所見>

① 2日ドック

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)
異常なし	5	17	10	10	4	46
痔核	0	0	3	4	1	8
大腸憩室	0	9	21	25	12	67
大腸炎	0	2	4	1	0	7
大腸ポリープ	2	16	34	46	20	118
表面隆起型病変	0	0	2	0	0	2
粘膜下腫瘍	0	0	0	2	1	3
その他の病変	2	0	9	13	6	30
総計	9	44	83	101	44	281

<女性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)
異常なし	3	5	14	11	4	37
大腸憩室	0	0	4	3	3	10
大腸炎	1	0	0	0	0	1
大腸ポリープ	1	0	4	9	4	18
表面隆起型病変	0	0	1	3	0	4
その他の病変	0	3	1	3	0	7
総計	5	8	24	29	11	77

② 保険診療外来

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	70～79	合計(人)
異常なし	1	1	0	1	0	3
痔核	0	0	0	0	1	1
大腸憩室	0	0	1	0	0	1
大腸ポリープ	0	2	4	2	0	8
総計	1	3	5	3	1	13

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	合計(人)
異常なし	0	1	0	1	0	2
痔核	0	0	0	1	0	1
大腸炎	0	0	1	0	0	1
大腸ポリープ	2	0	0	0	1	3
その他の病変	1	0	0	0	0	1
総計	3	1	1	2	1	8

<大腸組織検査結果>

<男性>

	30～39	40～49	50～59	70～79	合計(人)	比率(%)
Group I	0	1	0	1	2	50.0
Group III	1	0	1	0	2	50.0
受診者数(人)	1	1	1	1	4	100.0

<女性>

	30～39	合計(人)	比率(%)
Group III	1	1	100.0
受診者数(人)	1	1	

Group I : 正常組織および異型を示さない良性病変

Group II : 異型を示すが良性と判定される病変

Group III : 良性と悪性の境界領域の病変

Group IV : 癌が強く疑われる病変

Group V : 癌